



CroxX Stim

CROXX STIM AMINOPOWER

منشطات حيوية لتعزيز مقاومة النباتات

Biostimulants pour renforcer la résistance des plantes

هو محفز حيوي يحتوي على أحماض أمينية ذات أصل نباتي للتطبيق الورقي والتسميد عبر الري. بفضل نقائه الاستثنائي، يتم امتصاص الأحماض الأمينية النباتية بسرعة فائقة مع الحد الأدنى من استهلاك الطاقة، ويمكن للنبات استخدامها بنسبة 100% للحصول على استجابة فورية.

زيادة إنتاج الكلوروفيل وتسريع النمو.

تحسين تخليق الفيتامينات والدهون.

تحفيز نمو الجذور.

تحسين الإزهار وعقد الثمار.

تحسين معايير الجودة: درجة بريكس، الحجم واللون.

توفير مقاومة أكبر للآفات النباتية والعوامل الممرضة.

Est un biostimulant contenant acides aminés d'origine végétale pour l'application foliaire et la fertigation. Grâce à sa pureté exceptionnelle, les acides aminés d'origine végétale sont absorbés extrêmement rapidement avec une demande d'énergie minimale et sont utilisables à 100% par la plante pour une réponse immédiate.

- Augmente la production de chlorophylle et accélère la croissance.
- Améliore la synthèse des vitamines et des lipides.
- Stimule la croissance des racines.
- Améliore la floraison et la nouaison.
- Améliore les paramètres de qualité : le degré de Brix, le calibre et la couleur.
- Offre une plus grande résistance aux phyto-ravageurs et aux agents pathogènes

Culture	المحصول	Dosage	الجرعة	Application foliaire	التطبيق الورقي
Cultures maraichères	الخضروات	200-300 ml/100l	100 مل/ل	2 à 4 passages une semaine après repiquage tous les 10 à 15 jours d'intervalle	من 2 إلى 4 تطبيقات بعد أسبوع من الشتل، مع التكرار كل 10 إلى 15 يومًا
Céréales	الحبوب	1-2 l/ha	هكتار	1 à 2 passages	1 إلى 2 تطبيقات
Pomme de terre	البطاطا	100-200 ml/100l	100 مل/ل	Tout au long du cycle associé au passage phytosanitaire	طوال دورة النمو مع المعالجة الوقائية
Agrume et Arbres fruitiers	الحمضيات وأشجار الفاكهة الزيتون والكروم (ما عدا البرقوق)	150-200 ml/hl	مل/هكتولتر	2 à 4 passages pendant les phases critiques floraison, nouaison, grossissement...	إلى 4 تطبيقات خلال المراحل الحرجة: الإزهار، عقد الثمار، نمو الثمار...

Culture	المحصول	Dosage	الجرعة	Fertigation	التسميد عبر الري
Cultures maraichères	الخضروات	1.5-2 l/ha		Pendant toute la saison de culture, une fois par semaine	طوال موسم الزراعة، مرة واحدة أسبوعيًا
Pomme de terre	البطاطا	1.5-2 l/ha		Tout au long du cycle, une fois par semaine	طوال دورة النمو، مرة واحدة أسبوعيًا
Arboriculture	الأشجار المثمرة	1.5-2 l/ha		2 à 4 passages pendant les phases critiques floraison, nouaison, grossissement...	إلى 4 تطبيقات خلال المراحل الحرجة: الإزهار، عقد الثمار، نمو الثمار...

Composition



المحتوى (% وزن/وزن): 16.5 أحماض أمينية (10.0 أحماض أمينية حرة). 6.5 نيتروجين (N)
الكثافة (كغ/ل): 1.22 / الأس الهيدروجيني (pH): 6.4-6.6

Contenu (% p/p) : 16,5 Acides aminés
(10,0 AA libres) , 6,5 N

Densité (kg/l) : 1,22 / pH : 6,4-6,6



1 L, 5 L, 20 L

التركيبة

